Phänologische Entwicklung der Vegetation in einem Laubmischwald im Jahresverlauf

- Vegetationsperiode einer Auswahl von frühblühenden Pflanzen der Strauch- und Baumschicht -

nach HESS (1983), SLOBODDA (1985), HÄRTDLE et. al (2004), ELLENBERG & LEUSCHNER (2010), DÜLL & KUTZNIGG (1988)



Belaubungszeitraum der sommergrünen Bäume und Sträucher

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1	Haselnuss												
2	Kornelkirsche												
3	Schwarzerle												
4	Espe												
5	Schlehe												
6	Salweide												
7	Hainbuche												
8	Vogelkirsche												
9	Silberweide												
10	Esche												
11	Hängebirke												
12	Rotbuche												
13	Stieleiche												
14	Spitzahorn												
		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
		10	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Phänologische Jahreszeiten

Kronblüten-Ausbildung mit Insektenbestäubung vor dem Blattaustrieb

Pollen- und Narben-Ausbildung mit Windbestäubung vor dem Blattaustrieb

Zeichenerklärung

phänologische Jahreszeiten

1	Vorfrühling
2	Erstfrühling
3	Vollfrühlimg
4	Frühsommer
5	Hochsommer
6	Spätsommer
7	Frühherbst
8	Vollherbst
9	Spätherbst
10	Winter

Phänologiestadien von Pflanzen der Strauch- und Baumschicht

- Zeitraum des Blühens
- Zeitraum der Belaubung: Sommergrüne und Wintergrüne
- Zeitraum des Abwerfens der Blätter bei Sommergrünen
- Zeitaum des Rückzugs auf verholzte und unterirdische Pflanzenteile
- Zeitraum des Reifens und Ausstreuens von Samen sowie des Abfallens von Früchten
- Verbleiben der Füchte im Herbst/Winter am Strauch/Baum: „Wintersteher“