Zug-Gilden der Brutvögel im Rumbecker Holz

keine regelmäßige Wanderung

1 Standvögel

Brutvogelarten, die das ganze Jahr über in der Region rund um ihr Brutrevier verbringen. Sie führen keine regelmäßigen, jahreszeitlich gebundenen Wanderungen in ein anderes Gebiet durch.

16 Vogelarten

Grünspecht, Buntspecht, Mittelspecht, Schwanzmeise, Kohlmeise (auch 5), Blaumeise, Sumpfmeise, Weidenmeise, Tannenmeise, Kleiber, Gartenbaumläufer, Waldbaumläufer, Kernbeißer, Gimpel (auch 5) Rabenkrähe (auch 5), Waldkauz,

regelmäßiger Wechsel zwischen Brut- und Überwinterungsquartier jährlicher mit Hin- und Rückwanderung

2 Kurzstreckenzieher

Brutvogelarten, die regelmäßig im Laufe des Jahres zwischen dem Brutquartier und dem Überwinterungsquartier im maritim geprägten Europa hin- und her ziehen. Eine Zugstrecke beträgt meist 100 - 1000 km (z.B. Westfrankreich).

7 Vogelarten

Zaunkönig (auch 5), Heckenbraunelle, Zilpzalp (auch 3), Singdrossel, Star, Eichelhäher (auch 5), Ringeltaube (auch 5)

3 Mittelstreckenzieher

Brutvogelarten, die regelmäßig im Laufe des Jahres zwischen dem Brutquartier und dem Überwinterungsquartier im Mittelmeerraum hin- und her ziehen. Eine Zugstrecke beträgt bis 1000 -2000 km.

2 Vogelarten

Zilpzalp (auch 2), Mönchsgrasmücke (auch 4)

4 Langstreckenzieher

Brutvogelarten, die Laufe des Jahres zwischen dem Brutquartier und dem Überwinterungsquartier in Afrika südlich der Sahara (tropisches West-, Zentralafrika, Ostafrika, Südafrika)hin- und her ziehen. Eine Zugstrecke beträgt über 4000 km.

6 Vogelarten

Fitis, Waldlaubsänger, Trauerschnäpper, Grauschnäpper, Gartengrasmücke, Mönchsgrasmücke (auch auch 3)

5 Teilzieher

Brutvogelarten, bei denen ein Teil der Population wandert, ein anderer Teil als Standvogel ständig im Brutgebiet verbleibt. Der im Brutgebiet verbleibende Teil sind oft Männchen oder ältere Vögel, der ziehende Teil sind meist Kurz- oder Mittelstreckenzieher.

9 Vogelarten

Buchfink, Amsel, Rotkehlchen, Kohlmeise (auch 1), Zaunkönig (auch 2), Eichelhäher (auch 2), Rabenkrähe (auch 1), Ringeltaube (auch 2), Gimpel (auch 1)

keine gezielte Wanderung

6 Strichvögel

Nach dem Brutzeitraum umherstreifende Brutvogelarten, oft Jungvögel, die eine ungerichtete Ausbreitungswanderung vom Brutstandort aus durchführen.

Die ungerichtete Ausbreitungswanderung findet in unterschiedlicher Ausprägung und Intensität bei den meisten Brutvogelarten statt.